

Clé de détermination simplifiée de quelques graminées au stade végétatif

Limbe très étroit en forme d'aiguille (au moins celles de la base)	Limbe large				
	Préfoliation pliée		Présence d'oreillettes	Préfoliation enroulée	
	Côtes bien visibles (face supérieure du limbe)	Côtes peu apparentes (face supérieure du limbe)		Pas d'oreillettes	
			Présence de poils	Pas de poils	
<p>Fétuque rouge : limbes raides, verts foncés ; limbes insérés sur la tige, larges, à côtes bien visibles ; limbes de la base, étroits, en aiguille ; ligule très courte, quasiment invisibles ; Oreillettes absentes ou réduites à de très courtes excroissances ; gainés fermés, souvent velues (non visible à l'œil nu).</p>	<p>Rav-grass anglais : plante cespiteuse (pousse en touffe) ; face inférieure du limbe très brillante ; souvent petites oreillettes (+ grandes chez le 4n) ; ligule courte, membraneuse ou verdâtre ; ped rouge (base de la gaine) ; nervure centrale bien marquée.</p> <p>Crételle : plante souvent fleurie, jamais en grosses touffes ; face inférieure brillante ; ligule courte à moyenne ; jamais d'oreillettes ; feuille souvent rétrécie au 2/3 du limbe ; pied souvent jaune-brun ; inflorescence en forme de "brosse à dents".</p>	<p>Dactyle : plante vigoureuse, en touffes, tige très comprimée à la base (stade jeune) ; limbe mat, vert-bleuté, souvent fortement caréné ; ligule longue et souvent déchirée.</p> <p>Pâturin # RGA Jamais d'oreillettes Traces de ski sur la face supérieure de la feuille.</p> <p>Pâturin annuel : plante basse, port étalé ; limbe vert-jaune, souvent plié en accordéon, souvent caréné (coque de bateau) ; ligule longue, laiteuse ; presque toujours en fleur, inflorescence sur 1 seul axe.</p> <p>Pâturin des prés : plante variable ; limbe vert-foncé, assez raide, à forte carène ; ligule blanche, très courte ou tronquée ; gaine parfois finement velue, présence de rhizomes, "pied de biche".</p> <p>Pâturin commun plante variable ; limbe vert-clair, tendre, à face inférieure luisante, à sommet en pointe, peu caréné ; ligule triangulaire, courte ou assez longue et pointue, translucide ; présence de stolons.</p>	<p style="text-align: center;">Côté inférieure du limbe brillant (plantes non velues)</p> <p>Rav-grass italien : port dressé, oreillette très embrassantes ; ligule courte, mais aussi haute que la base décolorée du limbe ; ped rouge ; inflorescence : épi d'épillets avec arêtes.</p> <p>Fétuque des prés : plante en touffe, oreillettes longues et larges ; ligule très courte, nettement moins longue que la base décolorée du limbe ; ped rouge ; dernière feuille souvent attachée à angle droit sur la tige ; inflorescence : panicule étalée.</p> <p>Fétuque élevée plante plus vigoureuse que les 2 précédentes ; limbe plus raide ; très souvent présence de quelques poils sur les oreillettes (parfois peu visibles) ; ligule courte, moins haute que la base décolorée des limbes ; ped rouge.</p> <p style="text-align: center;">Limbe mat</p> <p>Chiendent limbe glabre ou velu, mais toujours rêche ; gaine inférieure souvent poilue ; ligule courte ; oreillettes fines et longues, souvent embrassante ; présence de rhizomes ; inflorescence en "pas de canard".</p>	<p>Houlque = gaine fendue # Brome = gaine soudée</p> <p>Houlque laineuse : plante entièrement velue (limbe et gaine), molle, douce au toucher ; bord du limbe poilu ; souvent en grosses touffes ; ligule longue, blanche, tronquée et bien denticulée ; nervures rouges-violettes sur gaine de la base (pyjama) ; fauche tardive.</p> <p>Brome mou : plante entièrement velue, poils plus concentrés au niveau des nœuds, jamais en grosses touffes ; gainés à bords soudés s'ouvrant en V ; ligule assez courte, blanche sale, denticulée ; pas de nervures rouge-violettes sur gaines de la base, mais parfois des stries brun-rouge sur les gaines ; inflorescence en épillets avec arêtes.</p> <p>Flouve odorante plante peu poilue, mais touffes de longs poils à la jonction du limbe et de la gaine ; souvent ligule très courte, peu visible ; parfois petites oreillettes ciliées avec ligule moyenne, translucide, plus ou moins tronquée.</p>	<p>Fléole : limbe mat, ondulé, vert gris-bleuté ; ligule longue, blanche, denticulée avec souvent 2 petites pointes aux extrémités ; tige robuste, dressée, souvent renflée en bulbe à la base, racine blanche ; 2 arêtes par épillets.</p> <p>Fromental limbe mat (aspect d'une fléole au stade jeune), mais parfois légère pilosité sur sa face supérieure, parfois aussi sur les nœuds, souvent rétréci au 2/3 de la hauteur et montrant des lignes de lumière par transparence ; ligule blanche, moyenne, grossièrement dentée ; tige assez grêle ; racine jaune-orange.</p> <p>Vulpin des prés : limbe large ; côtes secondaires bien marquées et irrégulières sur la face supérieure du limbe ; dernière feuille souvent enroulée ; côté inférieur du limbe souvent brillant ; ligule courte à moyenne, translucide, tronquée ; tige robuste, dressée, ped rouge ; présence de rhizomes courts ; épillets à une seule arête.</p> <p style="font-size: small;">Agrostides = tiges grêles et nervures bien visibles</p> <p>Agrostide stolonifère : plante rampante, limbe vert foncé ; ligule symétrique, bien développée, ± arrondie au sommet, blanc sale ; tige parfois rougeâtres ; présence de longs stolons.</p> <p>Agrostide commun plante couchée, parfois stolonifère ; limbe plus mat, gris-bleu ; ligule + courte que la précédente, si ligule + longue</p>